

基準値とは

- ・基準値は「正常な人の95%が当てはまる値」と理解してください。
- ・基準値は「検査方法」「機器の種類」「試薬の種類」等によって微妙に異なります。
- ・基準値から外れているからといって、必ずしも異常というわけではありません。
- ・気になる点は主治医にご相談ください。

項目	基準範囲	単位
TP	6.5-8.3	g/dl
Alb	3.8-5.1	g/dl
TCH	128-219	mg/dl
HDL	40-96	mg/dl
LDL	0-140	mg/dl
TG	30-149	mg/dl
BUN	8-21	mg/dl
CRN	男性 0.6-1.1 女性 0.4-0.8	mg/dl
eGFR		ml/min
UA	男性 3.5-7.5 女性 2.3-5.7	mg/dl
NH3	12-66	μ g/ml
Na	134-147	mEq/L
K	3.6-5.0	mEq/L
Cl	99-107	mEq/L
Ca	8.5-10.5	mg/dl
IP	2.3-4.5	mg/dl
LD	106-211	IU/L

項目	基準範囲	単位
AST	8-38	IU/L
ALT	4-44	IU/L
ALP	104-338	IU/L
γ -GTP	18-66	IU/L
CHE	185-430	IU/L
AMY	43-136	IU/L
CK	61-255	IU/L
LAP	30-70	IU/L
TTT	1.5-13.0	U
ZTT	1.5-13	U
T-Bil	0.2-1.2	mg/dl
D-Bil	0.0-0.2	mg/dl
Fe	男性 80-200 女性 70-180	μ g/dl
UIBC	男性 170-250 女性 180-270	μ g/dl
BG	60-110	mg/dl
HbA1c(JDS)	4.3-5.8	%
HbA1c(NGSP)	4.7-6.2	%

項目	基準範囲	単位
WBC	35-90	10 ² /ml
RBC	男性 430-570 女性 370-500	10 ⁴ /ml
Hb	男性 13.1-17.6 女性 12.1-15.2	g/dl
Htc	男性 39.8-51.8 女性 33.4-44.9	%
MCV	81-99	fL
MCH	28-34	pg
MCHC	32-36	%
Plt	13-35	10 ⁴ /ml
RDW	11.5-15.5	fL
MPV	7.4-10.4	fL
網状赤血球	男性 2-27 女性 2-26	%
Net	男性 27-87 女性 28-90	%
Lym	男性 19-59 女性 18-58	%
Mono	0-12	%
Eos	0-3	%
Bas		%

項目	基準範囲
ブドウ糖	(-)
蛋白質	(-)
ウロビリノーゲン	(±)
pH	4.5-8
潜血	(-)
ケトン体	(-)
クレアチニン	(-)
亜硝酸塩	(-)
白血球	(-)
ビリルビン	(-)

項目	基準範囲	単位
PT(INR)	0.8-1.2	
PT(%)	80-100	%
APTT	25-40	秒
Fib	200-400	
FDP	0-5	
Dダイマー	0-1	
出血時間	1-5	分
凝固時間	7-12	分

項目	基準範囲	単位
TSI	0.5-4.7	μ IU/ml
FT3	1.45-3.48	pg/ml
FT4	0.71-1.85	ng/ml
BNP	0.0-18.4	pg/ml
CEA	0.0-5.0	ng/ml
CA19-9	0.0-37.0	U/ml
PSA	0.0-4.0	ng/ml
フェリチン	男性 17.6-308.5 女性 3.4-257.8	ng/ml
HBs抗原	0.0-0.04	IU/ml
HCV抗体	0.0-0.99	S/CO
TPHA	0.0-0.4	S/CO
RPR	(-)	
ジゴキシン	0.8-2.0	μ g/ml
テオフィリン	10-20	μ g/ml

(-)が正常の検査
リウマチ因子
トロップT
ピロリ迅速検査
マイコプラズマIgM抗体
マイコプラズマ抗原
A群溶血連鎖球菌抗原
アデノウイルス抗原
RSウイルス抗原
インフルエンザウイルス抗原
尿中肺炎球菌抗原
尿中レジオネラ抗原
ノロウイルス抗原
CDtキシン
便中ヘモグロビン